

مروا-کائین

ژل بی حسی حاوی ماده موثر بی حس کننده



مروا-کائین

ژل بی حسی حاوی ماده موثر بی حس کننده

مدل ۱ و ۲

مروا-کائین ماده بی حسی موضعی با اثرگذاری سریع و طولانی مدت است. ماده موثره بی حس کننده موجود در این محصول، موجب بی حسی و تسکین موقت درد در طی مراحل مختلف درمان می شود. این ژل، درد ناشی از ورود سوزن، زخم، خراش یا سوزش داخل دهان را تسکین می دهد.

ترکیبات: پلی اتیلن گلایکول، ماده موثر بی حس کننده آمیدی و استری، طعم دهنده خوراکی، رنگ مجاز خوراکی.

این محصول در دو مدل ارائه میگردد.

مدل ۱ شامل یک ظرف ۳۰ ml حاوی ژل بی حسی با ماده موثره **بنزو کائین** میباشد. این مدل در ۳ طعم و رنگ شامل توت فرنگی، بلوبری و آدامس عرضه میشود.

مدل ۲: شامل یک ظرف ۴۰ ml حاوی ژل بی حسی با ماده موثره **لیدوکائین** میباشد. این مدل در ۳ طعم و رنگ شامل توت فرنگی، بلوبری و آدامس عرضه میشود.

کاربرد:

جهت پیشگیری و کاهش موقت درد و سوزش ناشی از:

- جراحی جزئی، از جمله تزریق بی حسی موضعی، قالبگیری و یا انجام پروفیلاکسی
- درد در ناحیه دهان
- آسیب جزئی لثه ها
- آسیب جزئی دهان و لثه ناشی از پروتز دندان یا وسایل ارتودنسی

مزایا:

- در طعم های مختلف و مناسب
- بی حسی سریع لثه (شروع از دقیقه ۱ تا ۲) زمان اثربخشی و ماندگاری بین ۸ تا ۱۰ دقیقه پس از شروع
- کاهش حداکثری درد
- عدم جذب سیستماتیک

احتیاط:

- در صورت ایجاد حساسیت و التهاب و تحریک مخاط، بلافاصله با آب شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید
- این محصول را تزریق نکنید.

در صورت خوردن مقدار زیادی یا بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید. استفاده از رابردم در هنگام کار با محصول ضروری است. توصیه می شود از تجهیزات ایمنی (عینک، دستکش و کلاه) استفاده شود. فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.

- از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوست، فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشو داده شود. و با پزشک مشورت کنید.
- قبل از استفاده در دهان بیمار، جریان ماده از سرنگ را امتحان ننمائید.
- قفص از سرسوزن قرار داده شده در بسته بندی استفاده کنید. برای جلوگیری از ایجاد آلودگی، از هر سرسوزن یکبار استفاده ننمائید.
- از مصرف در موارد مشابه خودداری کنید.
- از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری ننمائید.
- در پایان کار محصول را بطور کامل آبکشی و خارج ننمائید.

هشدار:

- محصول را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- محصول را پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی ظرف استفاده نکنید.
- در بسته بندی اصلی و در دمای اتاق نگهداری شود.
- در بیماریانی که حساسیت به این ماده موثره دارند استفاده نشود.
- دستور العمل استفاده:**
- در بزرگسالان و کودکان بالای چهار سال:
- یک لایه نازک را روی محل آسیب دیده گذاشته و اجازه دهید حدود دو دقیقه در محل بماند.
- جهت پاک کردن ژل آن را از روی لثه برداشته و سپس آبکشی کنید.

عوارض جانبی احتمالی:

- مصرف ماده بیحسی لیدوکائین و بنزو کائین در دندانپزشکی به منای دندان هیچ آسیبی نمی‌رساند اما مصرف بیش از حد آن احتمال زخم کردن لثه ها و گونه ها را به همراه دارد.
- در صورت مصرف بیش از حد مجاز باعث عوارضی مانند گیجی، تضعیف و اختلال تنفسی، سوزش، ورم یا حساسیت پوستی، خارش و کپهر میشود.
- در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی به مرکز پزشکی مراجعه شود.

منع مصرف:

- ایمنی و کارایی لیدوکائین و بنزو کائین در کودکان کمتر از ۴ سال سن، تأیید نشده است.
- برای افراد بالای ۴ سال بیش از هر ۶ ساعت تکرار نشود.
- لیدوکائین در صورت استفاده طبق دستورالعمل همراه معمولاً دارویی ایمن و بی خطر است، در صورت استفاده بیش از حد مجاز دارای عوارض جانبی میباشد. (مطالعه بخش عوارض جانبی)
- مصرف لیدوکائین و بنزو کائین در این دوز در دوران بارداری و شیر دهی بی خطر در نظر گرفته شده است.
- استفاده از مروا-کائین برای بی حسی لثه، باعث اثر و اختلال روی داروهای دیگر نمیشود.
- در بیمارانی که حساسیت دارویی نسبت به لیدوکائین و بنزو کائین و حساسیت بیش از حد به مواد شیمیایی و مواد تشکیل دهنده این محصول دارند استفاده نشود.
- این محصول برای افراد مسن، بیماری های خاص و کودکان بالای ۴ سال منع مصرف ندارد.



تهیه شده در شرکت مروابن
ساخت ایران
MORVABON.COM



سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تهیه شده در شرکت مروابن
ساخت ایران
۴۶۹۴۰۳۵۶
IMD: 54294960

ساخته شده در شرکت تولیدی مروابن فارمد:

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز، بلوک ۷، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.

شماره تماس: ۰۰۹۸۱۶۶۵۸۱۸۳ • فکس: ۰۰۹۸۱۶۶۶۰۸۱۹

ایمیل: info@morvabon.com

آدرس کارخانه: تهران، ۲۰ کیلومتری جاده دماوند، پارک علم

و فناوری پردیس، ساختمان سراج.

طبقه دوم، واحد ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۹

شماره تماس: ۰۰۹۸۱۶۶۲۵۱۷۰۲ • فکس: ۰۰۹۸۱۶۶۲۸۱۴۷

Morva-Caine

Anesthetic Gel Contains Active Ingredients

Morva-Caine is a rapid-acting and long-lasting product. Anesthetic gel provides temporary relief of pain and discomfort during procedures. The gel comforts patients with ulcers, wounds or other minor mouth irritations. **Composition:** PEG, Anesthetic Active Ingredients, Flavor, Food color.

This product is offered in 2 Model

Model 1: Includes a **30 ml** container of gel with the active ingredient **Benzocaine**. This model is available in 3 flavors and colors, including strawberry, blueberry, and bubble gum.

Model 2: Includes a **40 ml** container of gel with the active ingredient **Lidocaine**. This model is available in 3 flavors and colors, including strawberry, blueberry, and bubble gum.

Intended use:

For the temporary relief of occasional minor irritation and pain, associated with:

- ▶ Minor dental procedure, including local anesthesia injections, scaling or prophylaxis. It may also be used to temporarily relieve discomfort of the oral mucosa
- ▶ Sore mouth
- ▶ Minor injury of the gums
- ▶ Canker sores
- ▶ Minor irritation of the mouth or gums caused by dentures or orthodontic appliance
- ▶ Periodontal curettage
- ▶ Root planning

Advantages:

- ▶ Great tasting and pleasing to patients
- ▶ Quickly relieves patient discomfort (Start at 1-2 min)
- ▶ Maximum strength pain relief
- ▶ No systemic absorption
- ▶ Duration of effectiveness: 8-10 min

Instruction for use:

Adults and children 4 years of age and older:

- ▶ Apply (a thin film) to affected area and allow to remain in place approximately 2 minutes.
- ▶ Rinse and expectorate to clear the oral cavity of residual product.

Warning:

- ▶ keep in cool and dry place.
- ▶ Keep out of reach of children.
- ▶ Do not use after the expiration date.
- ▶ Store in the original container at room temperature.

Precautions:

- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with **Morva-Caine**
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using Morva-Caine
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water.
- ▶ In case of consumption drink copious amount of water.
- ▶ In case of allergies and irritation of the mucous membrane, rinse with water immediately and visit a doctor.
- ▶ Do not induce vomiting.
- ▶ Seek medical advices.
- ▶ For professional dental use only.
- ▶ Do not use in similar cases.
- ▶ At the end of the work, it is not necessary to wash with water or serum, and just remove the extra amounts from the patients mouth.
- ▶ For dental use only


Possible Side Effects:

- ▶ The use of Lidocaine and Benzocaine anesthetics in dentistry does not harm the enamel, but overuse can damage the gums and cheeks.
- ▶ If consumed in excess, it can cause side effects such as dizziness, shortness of breath, burning, swelling or tenderness of the gums and skin, itching and hives.
- ▶ In case of any side effects, refer to the medical center.

Contraindication:

- ▶ The safety and efficacy of Lidocaine and Benzocaine in children under 4 years have not been established.
- ▶ For people over 4 years old, do not repeat more than every 6 hours.
- ▶ Morva-caine is usually a safe drug if used according to the instructions.
- ▶ In case of excessive use, it has side effects (study the side effects section).
- ▶ The use of Lidocaine and Benzocaine in this dose is considered safe during pregnancy and lactation.
- ▶ Using this product topically for the gums does not cause disorders and interference with other drugs.
- ▶ Do not use in patients with drug allergies to Lidocaine, Benzocaine and anesthetics and other chemicals and ingredients.

This product is not contraindicated for the elderly, certain diseases and children over 4 years.



Morva-Caine

Anesthetic Gel
Model 1 & 2

- ISO13485 : 2016
- Iso 18001: 2007
- Iso 9001: 2015
- Iso 10002: 2014
- Iso 14001: 2015
- Iso 10004: 2012

MEDICAL EQUIPMENT DEPARTMENT
Production License No. 46940356
IMD: 54294960

manufacturer
Pardis Morvabon Pharmed Co.:
Head Office: Unit 154, 7nd floor, 7 block,
Borjiaz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran
Tel: 0098 21 6658 1838
Fax: 0098 21 6690 8819
Factory: Unit 135,136,139, 2nd floor, Seraj Bd.,
20thkm of Damavand Rd., Tehran, Iran
Tel: 0098 21
Fax: 0098 21